



Memoire, et Observations

de J. Dolignon m^{re} en chirurgie

Laon. quil a l'honneur de
presenter a L'Academie royale de
chirurgie de Paris.
n^o 182.
pour l'année 1784.



I. Obs¹. La femme Suin de la paroisse
de la Ferté au Duché de Guise généralité
de Soissons. Sujette a une goutte issiatique
laiteuse qui la tourmentoit depuis 18. mois qu'
elle étoit accouchée, quoi qu'elle eut nourri son
enfant. En mars 1782. Il lui est survenu
un phlegmon des plus considerable dans
toute l'étendue de la fesse gauche, qui s'est
terminée par un grand abcès, que l'on n'a
laissé percer de lui même: La tumeur a-
yant suppuré prodigieusement pendant trois

ARC 20 d. 113

mois, par des ouvertures malheureusement trop étroites. En aoust même année je visitois la malade, Il sortoit par les entrées de cette ulcère une matière sanieuse et jaunâtre, quant à la première orifice qui a commencée à tant Supurer, elle étoit à son entrée dure-calleuse, Située latéralement à trois doigts de l'épine antérieur et inférieur de l'os de l'ille gauche; la Sonde entroit à deux poudes de profondeur sous le muscle et l'aponevrose du facialata en parcourant entre le-grand, et le moyen fessier pour aller se rendre par une seconde ouverture Située à un pouce de l'anus. La longueur de cette fistule étoit de six poudes, Sur deux de profondeur elle me parut assez large dans tout son trajet. La faiblesse de la malade, presque épuisée à cause de l'abondante et longue Supuration m'embarassoit infiniment Sur le choix que je devois prendre pour tenter la guérison.

l'operation me parut d'abord le moyen con-
-venable, mais la grande perte de substance, et
les accidents avenirs me firent abandonner ce
projet de meme que celui que j'avois conçu
du cote de dilatation, et de injections.

me rappelant les guerisons des fistules à
l'anus operé par le plomb, je me decidois, vu
l'état de la malade, et celui de la maladie



pour cette methode. Et j'introduisis un plomb
d'une ligne et demie de diametre par l'ouver-
-ture du facialata que je conduisis par le mo-
-yon d'une longue lardoire a qui j'avois donné
avant une courbure convenable au chemin
que parcourait la fistule. L'instrument re-
-sortit par l'ouverture a cote de l'anus, et
laissant la ligature de plomb qui l'avoit suivie,
les deux bouts furent reunis pour en faire
une legere torsion, et quoiqu'à le plomb ne fût
que peu serré les premiers jours, il est survenu

de l'inflammation a cette partie que, l'ap-
-plication des emollients dissiperent en cinq a six
jours, ces topiques aiderent encore a former une
ample et abondante supuration d'un meilleur
caractere. Les pansements ne consistoient qu'a
laver avec le vin, les entret. de l'ulceres, et d'ap-
-pliquer par dessus une large emplatre d'ongt.
de la mere. Le sixieme jour je reserois un
petit leplomb qui en comprimant les chairs a
cause beaucoup de douleurs et la fièvre, les mêmes
cathaplasmes que ci devant firent cesser en
quatre jours ces accidents. Le dixieme jour de
l'operation le retrecissement d'une ligne ne lui a
pas ete sensible. Tous les 4. a 5 jours je
serrois la ligature qui a tombé le dix may 1783.
elle a resté neuf mois et dix jours, pour cou-
-per la plus grande partie du grand fessier, du
muscle et de l'aponeurose superficielle, ainsi que
le peau et son tissu adipeux; De sorte que depuis
-puis, cette femme est parfaitement bien.

-guérie ; elle marche à son ordinaire quoi-
-qu'une partie des muscles adducteurs, et
extenseurs de la cuisse aient été divisés par
la ligature ; les chairs se sont contractées
de part et d'autre pour y laisser une bonne
cicatrice profonde, qui a sept pouces de long.

II . OBS .

En May 1783. Je
profitois du temps pour operer Simon Brille
de mon ceaux près Lafere en Picardie, d'une
fistule à l'anus borgne externe portant dix
sept lignes de profondeur, causée trois ans
avant par un abcès considerable arrivé à
cette partie, étant latéralement à côté de
l'uretre remontant vers l'anus . Le malade
préparé ; l'operation fut faite en trois minutes
et le malade guérit en deux mois ; la perte de
substance du sphincter de l'anus a été d'un
pouce de haut, et de deux en dehors, qui en
fait trois de longueur, sur deux de large, et
un pouce demi de profondeur.



Voici ce que cette operation m'offrit de
particulier, la Sonde flexible introduite dans
la fistule sortant par l'anus, ma Section com-
-me je l'ai dejà dit n'a duré que trois mi-
-nutes quoiqu'en disant qu'ant le long de l'utérus
Je n'ai pas fait de gouttière, l'expérience
ma prouvé qu'elle n'étoit pas nécessaire pour
bien faire l'operation, elle ne consiste qu'à
couper et emporter a propos tout ce qui est dur
calleux et fistuleux; Il n'y a pas eu difficulté
d'uriner a cause de l'operation près le conduit
de l'urine, pas meme arrivé par compression
pour arreter l'hémorrhagie. A l'instar de
certains praticiens je ne me suis pas servi
de tente pour introduire dans le rectum, mais
seulement de la charpie sèche en plumaceaux
sans l'intermède d'aucun ongt. au bout de
quatre jours l'appareille est tombé
et la Supuration étoit bien formée. Je ne
renouvellais la plege avec la charpie sèche

que tous les 48. heures, J'essuiois seu-
-lement a chaque pensement la matiere qui
se trouvoit sur les bords delaplaye, laissant
dessus celle qui se trouvoit sur la plaie qui
etait l'ongt naturel dont, je me suis servi
jusque parfaite guerison. Je puis assu-
-rer que par cette methode il n'est sur-
-venu aucun accident etranger pendant
tous le temps de la cure; le malade va
a la selle comme avant son operation l'a-
-nus n'est pas receré ni trop ouvert, et
ses fonctions s'exercent a l'ordinaire.

III . OBS . Un domestique de
45 ans des environs de Laon, tomba ala
maison derriere en charoyant, et la voiture
chargee lui passa sur le corps, en descendant
obliquement sur l'épaule, le bras demi flechi
l'avant bras et la main, dont le dessus fut
presque arrache, cette chute lui a faite ou
causee quatre fractures, trois etoient com-



pliquées à l'extrémité Supérieure gauche, et
la quatrième arrivait à la clavicule même côté.
La première étoit à la partie moyenne de l'hu-
merus compliquée d'une forte equivoque,
La deuxième et troisième de ses fractures
se trouvoient le long de l'avant bras, avec
radius, et au cubitus occasin, Deux pièces de
cet os en sortirent de 4. à 5. lignes le long de la
partie inférieure. Les tendons extenseurs du
pouce, et les tendons extenseurs commun des
doigts se sont trouvés déchirés par une grande
plaie de tous le carpe, et metacarpe en des-
sus de la main. Ces trois fractures ont
été réduites et soutenues par des bandages à
dix huit chefs à l'effet de faciliter les
pansements, ainsi que ceux de la main,
l'espace de trois mois, terme qui a été suffi-
sant pour la guérison.

La quatrième des fractures étoit arrivée à la
partie moyenne de la clavicule, la réduction en

fut faite en écartant, l'épaule et l'acromion, en mettant quelque chose de solide sous les vertèbres dorsales. Je n'ai pas appliqué de bandage à cette fracture pour la soutenir à cause de la difficulté de remuer le bras écrasé. je mis simplement une large compresse imbuë d'eau de vie camphrée à l'endroit de la cassure, que je sentoie être bien réduite tous les jours: au bout de trois semaines le cal en étoit dure solide, et bienfait, et le blessé fut bien guéri sans aucune inégalité à cet os, qui à la suite de la fracture laisse presque toujours un bout de cet os croisé l'un sur l'autre: Le bandage en serrant et rapprochant, ne contribueroit il pas à cet difformité?

IV . OBS . Une femme proche de Grecy Sur Seine âgée de quatre vingt quatre ans, étant depuis longtemps cruellement tourmentée de la goutte, et de la dysenterie



depuis trois semaines; et le malheur
de se casser le bras a deux place, et la jambe
a une: elle guerit de ces trois fractures en
quarante jours, malgré la dysenterie, et
la gonorrhée; ce qui prouve que le grand âge
n'est pas toujours une obstacle a la guerison
des fractures, quand il y auroit complication.

V. Obs. Il s'est présenté
au mois d'octobre 1783. un jeune homme
de 16. ans près Vieux-en-Thierache, avec
un bec de lièvre de naissance. L'os maxil-
laire étoit fendu et écarté depuis le fond
de la bouche jusqu'au nez de la largeur d'un
doigt, et la lèvre supérieure étoit de plus
de trois; on lui voyoit les cornets infé-
rieurs du nez, et toute l'arrière bouche, ce
qui étoit affreux. on lui fit l'opération
à l'âge de trois ans qui ne réussit pas;
Je craignois aussi de ne pas réussir a cause
du grand écartement des lèvres, et de

l'élargissement de la fente maxillaire, qui
ne me laissoit pas de point d'appui. Cepen-
-dant je l'entrepris, et je fus assez heureux
d'obtenir le recollement au bout de quinze jours
de la resection, depuis le nez jusqu'à la partie
inférieure de la lèvre; même sans suture, en
prenant bien entendu toutes les mesures, que
l'art m'a pu suggérer.



